

## Psychologisches Institut – Psychopathologie und Klinische Intervention (Universität Zürich)

As terapias baseadas na *web* do centro psicoterapêutico da Universidade de Zürich dirigem-se às problemáticas do trauma e da perturbação do *stress* pós-traumático, sofrimento severo persistente e perturbações de adaptação. A abordagem é estruturada e orientada para os sintomas e visa melhorar as queixas e a qualidade de vida geral. A terapia consiste em 12 a 16 sessões que são realizadas duas vezes por semana. O modelo teórico de base é a terapia cognitivo-comportamental, que visa estimular o paciente a questionar os seus pensamentos, o reconhecimento de comportamentos disfuncionais e a elaborar estratégias melhores para lidar com situações de vida difíceis.

**Tópicos adicionais:** Perturbação de adaptação, Trauma e Perturbação de Stresse Pós-Traumático, Luto severo persistente

Grupos-alvo	Tópicos	Tipo de Melhores Práticas	Países
• Adultos	• Depressão • Trauma	• Terapia	• Suiça

### Descrição

The psychotherapeutic centre of the University of Zürich provides web-based therapies in the fields of trauma and post-traumatic stress disorders (PTSD), depression, persistent severe grief and adaptive disorders. The client is accompanied by a personal psychologist during the whole treatment. The therapy takes place via a secured internet platform and consists of 12 to 16 sessions. Each phase starts with a detailed introduction which explains the meaning of the practices. The client works on the tasks individually on the dates determined by him-or herself. The therapist reacts to the tasks within one work day. The basis of the modules is cognitive behavioural therapy which is scientifically proven to be appropriate for web-based therapies. The aim is to encourage the patient to question his/her thoughts, to recognize dysfunctional behaviours and to work out better strategies to cope with difficult life situations. The therapy for patients with trauma or post-traumatic stress disorder addresses people who had a traumatic experience at least three months ago and from which they still suffer. It consists of three phases which are self-confrontation, cognitive restructuring and sharing of fate. The therapy of depression includes five phases of treatment, these are: consideration of situations in which the patient is depressive, building up positive activities, become aware and change of negative and automatic thoughts, difficulties in interpersonal relationships as well as prevention of relapses. The treatment of persistent severe grief addresses people who sustained a traumatic loss and still suffer from that after six or more months. This kind of therapy is based on the same steps as the therapy of post-traumatic stress disorder. The treatments are not appropriate for people with addiction, dissociations, psychosis and suicidal tendencies.



↑ FACHRICHTUNGEN

Home

**Online-Therapie Behandlung**

Team

- Internet-Therapie von Trauma - Posttraumatischer Belastungsstörung
- Internet-Therapie von Depression
- Internet-Therapie von anhaltender schwerer Trauer

Studium

Forschung und Dissemination

**Psychotherapie**

Team

Die hier angebotene Internet-Behandlung von

Trauma - Posttraumatische  
Belastungsstörungen  
(Traumatherapie)

- Trauma - Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS)
- Depression
- Schwere Trauer

Depression

sind Therapien, die aus einer begrenzten Anzahl von 12 bis 16 Schreibsitzungen

Anhaltende schwere Trauer

bestehen und auf vorgegebene Behandlungsschritte beruhen. Jeder  
Behandlungsphase geht eine ausführliche Einleitung voraus, die den Sinn einzelner  
Übungen erklärt. Die Aufgaben bearbeitet der Klient zu den selbst festgelegten  
Terminen zweimal wöchentlich. Sie werden vom Therapeuten innerhalb eines  
Arbeitstages beantwortet und kommentiert. Diese Interaktion findet innerhalb eines  
passwortgeschützten Internetportals statt, das strengsten Sicherheitsvorkehrungen  
genügt.

Online-Therapie

Patienten-Information

**Online-Therapie Behandlung**

Alternativen

Es sind manualisierte, das heisst, strukturierte und auf Module aufbauende Therapien

Wissenschaft

mit kognitiv-verhaltenstherapeutischer Grundlage, die sich in verschiedenen Studien

Anmeldung

für die Anwendung als Internet-Therapien als besonders geeignet erwiesen haben.

Probleme im Alter

Ziel der kognitiven Verhaltenstherapie ist es, ein besseres Verständnis und Einblick in

Leichte Alzheimer-Demenz

die Erkrankung zu erhalten. Patienten werden ermutigt ihre problematischen

China-Projekt

Gedanken zu hinterfragen, hinderliche Verhaltensmuster zu erkennen und bessere

Kontakt

Strategien zu erarbeiten um mit schwierigen Lebenssituationen umzugehen. Der

Service public

Therapeut unterstützt den Klienten darin, korrektive, positive Lebenserfahrungen zu

Weiterbildung

machen, wichtige Lebensziele wiederzufinden, sowie Massnahmen zu planen und

Kontakt

durchzuführen.

## Idioma original

German

## Países

Switzerland

## Ligação

<http://www.psychologie.uzh.ch/de/fachrichtungen/psypath/Psychotherapie/Onlintherapie.html>

(access date: 07/04/2017)



CC - Atribuição-sem comercial-compartilha  
<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/>

ILI. *Psychologisches Institut – Psychopathologie und Klinische Intervention (Universität Zürich).*

Recuperado em Saturday May 18, 2024 de

<https://www.ecounselling4youth.eu/online-material/courses/TGP543/>



Co-funded by the  
Erasmus+ Programme  
of the European Union

O apoio da Comissão Europeia para a produção desta publicação não constitui uma garantia relativamente ao conteúdo da mesma, que reflete exclusivamente as perspetivas dos autores. A Comissão Europeia não pode ser responsabilizada pelo uso das informações aqui contidas

<https://www.ecounselling4youth.eu/project/>